

Žádanka na laboratorní vyšetření

Kód ZP IČP Odbornost Datum odběru 2 0 1 Čas odběru :



Číslo pojištěnce Pacient (příjmení, jméno, titul)

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Nemocnice Středočeského kraje se sídlem Kladno
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
www.nemocnicekladno.cz

Základní dg. Ostatní dg. Sex Adresa, bydliště

Klinická laboratoř

centrální příjem biochemie, hematologie tel.: 312 606 246
centrální příjem mikrobiologie tel.: 312 606 593
www.klinickalaborator.cz

Ve spolupráci



Čilova 303/10, 162 00 Praha 6
Centrální příjem: 235 312 264

Oddělení (stanice), Lékař (razítko, podpis) Telefon Odběr provedl
Počet požadovaných vyšetření:

ANA/ENA	Gastrointestinální blok	Buněčná imunita (FACS)
<input type="radio"/> ANA screen s typizací (s) 9001	<input type="radio"/> Campylobacter jejuni (s) 9025	<input type="radio"/> CD3, 4, 8 (EDTA) 9048
<input type="radio"/> ANA screen bez typizace (s) 9002	<input type="radio"/> Yersinia enterocolitica (s) 9026	<input type="radio"/> CD3, 4, 8, 19, 56 + 16 (EDTA) 9049
<input type="radio"/> SS - A (s) 9003	Celiakie, intolerance	<input type="radio"/> CD3/HLA DR+ (EDTA) 9050
<input type="radio"/> SS - B (s) 9004	<input type="radio"/> EMA IgA (s) 9027	<input type="radio"/> KO + dif. pro abs. hodnoty (EDTA) 9051
<input type="radio"/> Sm (s) 9005	<input type="radio"/> EMA IgG (s) 9028	
<input type="radio"/> RNP (s) 9006	<input type="radio"/> Anti kravské mléko (s) 9029	<input type="radio"/> HLA B27 (EDTA) 9052
<input type="radio"/> SCL - 70 (s) 9007	<input type="radio"/> Anti frakce mléka (s) 9030	
<input type="radio"/> Jo - 1 (s) 9008	<input type="radio"/> Anti soja (s) 9031	<input type="radio"/> Fagocytární aktivita (h) 9053
<input type="radio"/> Anti ds DNA (s) 9009	Autoimunitní hepatopatie	Ostatní autoimunita
<input type="radio"/> Anti nukleosomy (s) 9010	<input type="radio"/> AMA (mitochondrie) (s) 9032	<input type="radio"/> Anti parietální buňky (s) 9054
<input type="radio"/> Anti centroméra (s) 9011	<input type="radio"/> ASMA (hladký sval) (s) 9033	<input type="radio"/> Anti vnitřní faktor (s) 9055
<input type="radio"/> ANA blot (15 Ag) (s) 9012	<input type="radio"/> Anti LKM 1 (mikrosomy) (s) 9034	<input type="radio"/> Gastroblot (5Ag) (s) 9056
<input type="radio"/> ANA titrace - IgG (IF) (s) 9013	<input type="radio"/> Anti SLA (solub. jaterní Ag) (s) 9035	<input type="radio"/> Anti nadledvina (AADA) (s) 9057
<input type="radio"/> ANA titrace - IgA, M (IF) (s) 9014	<input type="radio"/> Anti LC1 (s) 9036	<input type="radio"/> CIK - PEG (s) 9058
Vaskulitidy	<input type="radio"/> Jaterní blot (4Ag) (AMA M2, LKM-1, SLA/LP, LC-1) (s) 9037	<input type="radio"/> CIKC1q (s) 9059
<input type="radio"/> MPO (s) 9015	IBD (nespecifické střevní záněty)	<input type="radio"/> ECP (s) ● 9060
<input type="radio"/> PR3 (s) 9016	<input type="radio"/> ASCA (s) 9038	Jiné
<input type="radio"/> GBM (s) 9017	<input type="radio"/> ALCA, ACCA (s) 9039	<input type="radio"/> Cholinesteráza (s) 9061
<input type="radio"/> ANCA profil (s) 9018	<input type="radio"/> Anti pohárkové buňky (s) 9041	<input type="radio"/> SHBG (s) 9062
<input type="radio"/> ANCA IF (s) 9019	<input type="radio"/> Anti vývody pankreatu (s) 9042	<input type="radio"/> QuantiFERON - TB Gold in tube krevní test pro dg. TBC
Dermatologický blok	Postvakační	
<input type="radio"/> Anti BM epidermis (s) 9020	<input type="radio"/> C. tetani - toxoid (s) 9047	
<input type="radio"/> Anti desmosomy (s) 9021		
Revmatologický blok		
<input type="radio"/> Revmatoidní faktor - IgA,G,M (s) 9022		
<input type="radio"/> Anti filagrin (s) 9023		
<input type="radio"/> Anti citrulin (s) 9024		

Návod na vyplnění:

Správně: ● Chybně: ✗ ✓



(s) - zkumavka pro přípravu séra s aktivátorem srážení a gelem (SARSTEDT - hnědý uzávěr) (EDTA) - zkumavka pro nesrážlivou krev s EDTA (SARSTEDT - červený uzávěr)

● - pro toto vyšetření je nutné co nejdříve oddělit sérum/plazmu od krvinek

(h) - zkumavka pro přípravu plazmy s heparinem sodným - vydá na požádání centrální příjem nebo odběrové pracoviště Klinické laboratoře.

Bližší informace - www.citylab.cz

Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno, a. s. - Odběrová pracoviště

Odběrové místnosti slouží pro ambulantní odběry pacientů, odběry biologického materiálu (krev, moč) na vyšetření biochemická, hematologická, koagulační, mikrobiologická, sérologická, vyšetření glykemické křivky.

Odběrové středisko I.

Palachova ul. 1620, Kladno 1

☎ 312 606 533

Odběrové středisko je umístěno proti střední průmyslové škole vedle náměstí Svobody.

Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odběrové středisko II.

1. PP s.r.o., Unhošťská 2533, Kladno 2

☎ 725 838 574

Zdravotní středisko čtyřobvod - *toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty!*

Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 12:00 hodin

Odběrové středisko III.

Oblastní nemocnice Kladno – CAM

☎ 312 606 243

Odběrové středisko v areálu nemocnice je umístěno v přízemí nové budovy *Centrum akutní medicíny* (vchod do budovy je z areálu nemocnice i z třídy ČSA).

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.

Otevřeno pondělí až pátek od 6:00 do 13:30 hodin

Odběrové středisko IV.

Poliklinika - Čsl. armády 414, Nové Strašecí

☎ 313 511 478

Odběrové středisko IV. je umístěno v přízemí Polikliniky Nové Strašecí (přízemí vpravo).

Toto odběrové středisko má bezbariérový přístup pro imobilní pacienty.

Otevřeno pondělí až pátek od 6:30 do 10:30 hodin

Pokyny pro odběr krve – k vyloučení zkreslení výsledků nutno dodržet následující pravidla:

1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pouze se svolením lékaře lze vynechat léky!
2. Odběr krve se provádí nalačno.
3. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje (nesladké vody).
4. Pokud jste **alergický** na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, **oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.**
5. Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
6. Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyký denní režim.
7. Musíte mít s sebou žádanku od ordinujícího lékaře, výjimkou je odběr krve za přímou úhradu (samoplátce). Ke kontrole údajů s sebou vezměte průkaz zdravotní pojišťovny.

Možné komplikace odběru krve:

- bolestivost v místě vpichu, většinou odezní do několika minut po odběru
- „modřina“ v místě vpichu, prevencí je řádné stlačení místa vpichu
- nevolnost, výjimečně i kolapsový stav, u hladovějících, nedostatečně hydratovaných, ve stresu, při probíhajícím onemocnění, prevencí je se co nejdříve po odběru najíst a dostatečně napít
- jedinci, kteří trpí na kolapsové stavy ve spojitosti s odběrem (pohled na krev apod.) toto oznámí předem, aby odebírající zdravotní personál k němu přistupoval se zvýšenou opatrností a měl jej pod dohledem i nezbytně dlouhou dobu po něm
- zarudnutí/vyrážka kolem místa vpichu, je možné, že pacient se stal alergickým na některou ze složek při odběru (dezinfekci, náplast,..), nutno konzultovat se zdravotnickým personálem, až po více dnech ve spojitosti s teplotou nelze vyloučit sekundární infekci, nutno kontaktovat ošetřujícího lékaře

Pokud by se pacient po odběru necítil dobře, oznámí tuto skutečnost zdravotnickému personálu.

Více informací k vyšetřením – viz. Laboratorní příručka (www.klinickalaborator.cz)